

今回の除角・去勢動画撮影に係る疼痛緩和措置等

	除角（1 か月齢）	除角（3 か月齢）	去勢
施術前措置	・保定 ・バリカンにより角周囲の毛刈り （焼烙による体毛の延焼防止、術後の清潔維持） ・メロキシカム（鎮痛剤）の皮下注射	・キシラジンの筋肉内注射 ・横臥位で保定 ・バリカンにより角周囲の毛刈り ・メロキシカムの皮下注射 ・角神経ブロック（塩プロ）	・メロキシカム皮下注射 ・キシラジンシの静脈注射（獣医師判断） ・横臥位で保定 ・切開部位の消毒 ・精索部、精巣実質の局所麻酔（リドカイン、獣医師判断）
術式	・除角器による摘芽 ・切断部へのモクタル塗布による化膿防止	・除角器（バーンズ）による切断 ・切断部の焼烙止血 ・切断部への抗生剤塗布による化膿防止	横臥位による観血去勢（精索結紮法） ・精索切断時、両側切断後抗生剤塗布・注入 ・術部全体に消毒液噴霧
施術後措置	・化膿等が見られないか注意深く観察	・化膿等が見られないか注意深く観察	・覚醒後、早期の起立を促す ・化膿等が見られないか注意深く観察